

Wykaz gatunków ptaków powstał głównie na podstawie obserwacji prowadzonych w latach 2005-2009 do Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego. Został uzupełniony przez obserwacje pracowników Nadleśnictwa. Dotyczy wyłącznie gatunków występujących na gruntach należących do Nadleśnictwa Złotów. Liczebność dla gatunków lęgowych określono na podstawie przedziałów zastosowanych w "Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność, zmiany" (Tomiałojć, Stawarczyk, 2003). Zastosowano następujące przedziały w odniesieniu do powierzchni Nadleśnictwa: gatunek bardzo nieliczny 1-2 pary, nieliczny 3-18 par, średnio liczny 19-185 par, liczny 186-1846 par, bardzo liczny powyżej 1846 par. Trend liczebności podano tylko dla wybranych gatunków ptaków na podstawie obserwacji z ostatniego dziesięciolecia.

Lp.	Nazwa gatunku	Nazwa łacińska	Status	Liczebność (dotyczy gatunków lęgowych)	Trend	Środowisko	Uwagi	Ochrona ¹⁾
1.	Perkozek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	lęgowy	nieliczny; 2 - 3 stanowiska 2-4 pary	↑	niewielkie zbiorniki wodne, płytkie i obficie zarośnięte stawy; Łąki Potockie, Stawy Szwarca	działania w Nadleśnictwie Złotów w ramach tworzenia obiektów małej retencji w tym odbudowa zbiorników przyczyniają się do powstawania nowych miejsc lęgowych dla tego gatunku	ŚCISŁA BD I kod gatunku A004
2.	Perkoz dwuczuby	<i>Podiceps cristatus</i>	lęgowy	bardzo nieliczny 1 para	↔	większe zbiorniki wodne; Jezioro Smólsk Duży		ŚCISŁA BD I kod gatunku A005
3.	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	przelotny, koczujący w okresie poza lęgowym			Jezioro Smólsk Duży, lasy wokół Jeziora Borówno	w najbliższym czasie nie można wykluczyć próby lęgów w drzewostanach wokół jeziora Borówno	CZEŚCIOWA BD I kod gatunku A391
4.	Bąk	<i>Botaurus stellaris</i>	lęgowy	nieliczny 2-3 stanowiska 2-3 pary	↔	rozległe szuwały głównie trzcinowe; Stawy Szwarca, Łąki Koczańskie		ŚCISŁA BD I kod gatunku A021
5.	Bączek	<i>Ixobrychus minutus</i>	prawdopodobnie lęgowy	bardzo nieliczny 1 stanowisko 1 para		stawy hodowlane i jeziora z dobrze rozwiniętą roślinnością wodną; Stawy Szwarca		ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A022
6.	Czapla siwa	<i>Ardea cinerea</i>	lęgowy, koczujący i zimujący	średnio liczny 1 stanowisko (kolonia) 27 par (gniazd)	↔	kolonia w Leśnictwie Kujan		CZEŚCIOWA
7.	Czapla biała	<i>Egretta alba</i>	zalatujący			Stawy Szwarca, Łąki Koczańskie	regularnie obserwowana na Stawach Szwarca w okresie przelotów	ŚCISŁA BD I kod gatunku A027
8.	Bocian czarny	<i>Ciconia nigra</i>	lęgowy	nieliczny 1-3 stanowiska 1-3 pary	↑	drzewostany często podmokłe głównie liściaste z obecnością dużych drzew; 2 strefy: Leśnictwo Łobzonka (od 3 lat gniazdo nie jest zajmowane), Leśnictwo Leśnik (gniazdo zajmowane regularnie) poza tym regularnie widywany w okresie lęgowy w północnej części Leśnictwa Wierchołek oraz na terenie Leśnictwa Kujan na południe od wsi Kujan	w wyniku poprawy stosunków wodnych w lasach poprzez działalność bobrów i budowę obiektów małej retencji wodnej w sposób znaczny poprawiają się warunki żerowania dla tego gatunku	ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A031

9.	Bocian biały	<i>Ciconia ciconia</i>	lęgowy	bardzo nieliczny 1 stanowisko 1 para	↔	koło leśniczówki Leśnik		ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A030
10.	Łabędź niemy	<i>Cygnus olor</i>	lęgowy	nieliczny; do 10 par	↑	wszelkie zbiorniki wodne	odnotowywany wzrost dzięki budowie obiektów małej retencji	ŚCISŁA BD I kod gatunku A036
11.	Łabędź krzykliwy	<i>Cygnus cygnus</i>	nieregularnie lęgowy	bardzo nieliczny; 1 para	↔	Stawy Szwarca	lęg stwierdzony w 2007 roku przez Wojciecha Płatę – raport Komisji Faunistycznej nr 10355 z dnia 20.11.2008 r.	ŚCISŁA BD I kod gatunku A038
12.	Gęgawa	<i>Anser anser</i>	lęgowy	nieliczny, 3-10 par	↔ lub ↑	zbiorniki wodne z obficie rozwiniętymi szuwarami; Łąki Potockie, Stawy Szwarca, Bagna Kocuńskie, Stebionek	odnotowywany wzrost dzięki budowie obiektów małej retencji	BD I kod gatunku A043
13.	Świstun	<i>Anas penelope</i>	przelotny					ŚCISŁA BD I kod gatunku A050
14.	Krakwa	<i>Anas strepera</i>	prawdopodobnie lęgowy	bardzo nieliczny lub nieliczny przy dolnej granicy oceny; minimum 1 para		niewielkie zbiorniki wodne; Stawy Szwarca	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A051
15.	Cyraneczka	<i>Anas crecca</i>	lęgowy	nieliczny; 2 pary		niewielkie zbiorniki wodne; Stawy Szwarca	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane, prawdopodobnie liczniejsza niż wartości podane w tabeli	BD I kod gatunku A051
16.	Krzyżówka	<i>Anas platyrhynchos</i>	lęgowy	nieliczny; ok. 15 par	↔ lub ↑	zbiorniki wodne wszelkiego typu		BD I kod gatunku A053
17.	Cyranka	<i>Anas querquedula</i>	prawdopodobnie lęgowy	bardzo nieliczny; 1 para		zbiorniki wodne; Stawy Szwarca	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A055
18.	Plaskonos	<i>Anas clypeata</i>	prawdopodobnie lęgowy	bardzo nieliczny; 1 para		zbiorniki wodne; Stawy Szwarca	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA BD I kod gatunku A056
19.	Głowienka	<i>Aythya ferina</i>	przelotny			zbiorniki wodne; Stawy Szwarca	dotychczas spotykana tylko na przelotach gniazdowania nie można wykluczyć	BD I kod gatunku A059
20.	Czernica	<i>Aythya fuligula</i>	przelotny			zbiorniki wodne; Stawy Szwarca	dotychczas spotykana tylko na przelotach gniazdowania nie można wykluczyć	BD I kod gatunku A061
21.	Gągoł	<i>Bucephala clangula</i>	lęgowy	nieliczny; ok. 5 par	↑	zbiorniki wodne wszelkiego typu; stawy Szwarca, Stebionek, dolina Gwdy		ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A055
22.	Nurogęś	<i>Mergus merganser</i>	lęgowy	bardzo nieliczny lub nieliczny	↓	starodrzew wokół jeziora Borówno, i jeziora Wierchołek	w ostatnim czasie spadła częstość stwierdzeń lęgowych nad jeziorem Borówno	ŚCISŁA BD I kod gatunku A056

23.	Trzmielojad	<i>Pernis apivorus</i>	lęgowy	nieliczny		lasy liściaste i mieszane; Leśnictwo Wąsosz i Leśnik	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA (**) BD I kod gatunku A072
24.	Kania czarna	<i>Milvus migrans</i>	prawdopodobnie lęgowy			w okresie lęgowym spotykana w Borach Kująskich	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A073
25.	Kania ruda	<i>Milvus milvus</i>	prawdopodobnie lęgowy			w okresie lęgowym regularnie spotykana w Leśnictwach Wąsosz, Leśnik oraz w okolicach Borów Kująskich	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A074
26.	Bielik	<i>Haliaeetus albicilla</i>	lęgowy	bardzo nieliczny lub nieliczny; 1-3 par	↑	stare drzewostany sosnowe często w pobliżu zbiorników wodnych, dotychczas utworzono 1 strefę w Leśnictwie Leśnik; poza tym często spotykany w Borach Kująskich przy jeziorze Borówno oraz koło Stawów Młyńskich w Leśnictwie Łobzonka		ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A075
27.	Blotniak stawowy	<i>Circus aeruginosus</i>	lęgowy	nieliczny; do 10 par	↔	trzciniowiska zbiorników wodnych również tych niewielkich; najliczniej na Stawach Szwarca oraz Bagnach Kocuńskich		ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A081
28.	Blotniak zbożowy	<i>Circus cyaneus</i>	przelotny					ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A082
29.	Jastrząb	<i>Accipiter gentilis</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny przy dolnej granicy oceny		kompleksy leśne	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA (**)
30.	Krogulec	<i>Accipiter nisus</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny przy dolnej granicy oceny		drągowiny sosnowe również niewielkie lasy w krajobrazie rolniczym	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA
31.	Myszolów	<i>Buteo buteo</i>	lęgowy	średnio liczny; 75 - 150 par	↔	wszelkie typy lasów, szczególnie obrzeża		ŚCISŁA
32.	Myszolów włochaty	<i>Buteo lagopus</i>	przelotny i zimujący					ŚCISŁA
33.	Orlik krzykliwy	<i>Aquila pomarina</i>	nieregularnie lęgowy	bardzo nieliczny, 1 para		podmokłe olsy graniczące z łąkami; 1 strefa w Leśnictwie Leśnik, gniazdo od kilku lat nie jest zasiedlane, poza tym regularnie widywany w okolicach Werska w Dolinie Łobzonki		ŚCISŁA BD I kod gatunku A089
34.	Pustulka	<i>Falco tinnuculus</i>	przelotny					ŚCISŁA (*)(**)
35.	Kobuz	<i>Falco subbuteo</i>	lęgowy	nieliczny; 5-10 par		brzegi większych lasów graniczące z terenami otwartymi lub zbiornikami wodnymi	wiele stanowisk ma charakter efemeryczny	ŚCISŁA (*)(**)
36.	Kuropatwa	<i>Perdix perdix</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny	↓	tereny rolnicze		
37.	Przepiórka	<i>Coturnix coturnix</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny przy dolnej granicy oceny		pola uprawne, często pola roślin okopowych		ŚCISŁA BD I kod gatunku A113

38.	Bażant	<i>Phasianus colchicus</i>	lęgowy	nieliczny		krajobraz rolniczy sąsiadujący z zadrzewieniami i zakrzewieniami, zwłaszcza w pobliżu trzcinowisk; regularnie spotykany na Łąkach Kocuńskich w Leśnictwie Wąsosz i Leśnik		
39.	Wodnik	<i>Rallus aquaticus</i>	lęgowy	nieliczny; ok. 10 par	↔	szuwały, rozlewiska i błota; najliczniej na Stawach Szwarca		ŚCISŁA BD I kod gatunku A118
40.	Kropiatka	<i>Porzana porzana</i>	prawdopodobnie lęgowy			turzycowiska i podmokłe kępiaste łąki; Stawy Szwarca		ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A119
41.	Zielonka	<i>Porzana parva</i>	prawdopodobnie lęgowy			turzycowiska i podmokłe kępiaste łąki; Stawy Szwarca		ŚCISŁA BD I kod gatunku A120
42.	Derkacz	<i>Crex crex</i>	lęgowy	nieliczny		podmokłe łąki z wysoką roślinnością trawiastą, stwierdzony m.in. na łąkach w Leśnictwie Witrogoszcz	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A122
43.	Kokoszka wodna	<i>Gallinula chloropus</i>	lęgowy	nieliczny; 5-10 par	↔	wszelkiego typu zbiorniki wodne		ŚCISŁA BD I kod gatunku A123
44.	Lyska	<i>Fulica atra</i>	lęgowy	nieliczny przy górnej granicy oceny	↔	wszelkiego typu zbiorniki wodne		BD I kod gatunku A125
45.	Żuraw	<i>Grus grus</i>	lęgowy	średnio liczny	↑	niewielkie bagienka śródleśne, obrzeża zbiorników wodnych		ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A127
46.	Sieweczka rzeczna	<i>Charadrius dubius</i>	lęgowa	nieliczny		w pobliżu wód stojących, również suche ugory, okresowo podtopione pola; Stawy Szwarca		ŚCISŁA BD I kod gatunku A136
47.	Czajka	<i>Vanellus vanellus</i>	lęgowy	nieliczny		podmokłe łąki o niskiej roślinności, obrzeża zbiorników wodnych; Łąki Potockie, Stawy Szwarca		ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A142
48.	Kszyk	<i>Gallinago gallinago</i>	lęgowa	nieliczny; max. do 10 par		podmokłe łąki, torfowiska, śródleśne bagienka, olsy: Stawy Szwarca, Łąki Kocuńskie, olsy w Borach Kujańskich		ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A153
49.	Słonka	<i>Scolopax rusticola</i>	lęgowy	średnio liczny		lasz głównie liściaste lub z domieszką gatunków liściastych; tokujące ptaki spotykane na terenie całego nadleśnictwa		BD I kod gatunku A155
50.	Brodzic śniady	<i>Tringa erythropus</i>	przelotny					ŚCISŁA BD I kod gatunku A161
51.	Kwokacz	<i>Tringa nebularia</i>	przelotny					ŚCISŁA BD I kod gatunku A164

52.	Samotnik	<i>Tringa ochropus</i>	lęgowy	średnio liczny; 20-30 stanowisk (par)	↑	zamieszkuje podmokłe i zalewowe okresowo olsy i łęgi, śródleśne bagienka i doliny rzeczne, zabagnione obrzeża zbiorników wodnych; najliczniejsza populacja w Borach Kujawskich i w lasach w dolinie rzeki Łobzonki	w wyniku poprawy stosunków wodnych w lasach poprzez działalność bobrów i budowie obiektów małej retencji wodnej w sposób znaczny poprawiają się warunki siedliska dla tego gatunku	ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A165
53.	Brodzic piskliwy	<i>Actitis hypoleucos</i>	przelotny					ŚCISŁA BD I kod gatunku A168
54.	Śmieszka	<i>Larus ridibundus</i>	nieregularnie lęgowy	nieliczny		Stawy Szwarca		ŚCISŁA BD I kod gatunku A179
55.	Rybitwa rzeczna	<i>Sterna hirundo</i>	nieregularnie lęgowy	nieliczny		Stawy Szwarca		ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A193
56.	Siniak	<i>Columba oenas</i>	lęgowy	średnio liczny; 50-100 par	↔ lub ↑	występuje w starych drzewostanach niemal wyłącznie z udziałem buka; Leśnictwo Witrogoszcz, Leśnik, Wąsosz, Łobzonka, Bory Kujawskie, Park Zwierzyniec		ŚCISŁA BD I kod gatunku A207
57.	Grzywacz	<i>Columba palumbus</i>	lęgowy	liczny		preferuje drzewostany liściaste i mieszane		
58.	Sierpówka	<i>Streptopelia decaocto</i>	lęgowy	nieliczny	↔	związana z osadami ludzkimi – koło leśniczówek		ŚCISŁA
59.	Turkawka	<i>Streptopelia turtur</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny		obrzeża lasów i zadrzewienia różnego typu	mniej liczna od siniaka	ŚCISŁA
60.	Kukulka	<i>Cuculus canorus</i>	lęgowy	średnio liczny lub liczny przy dolnej granicy oceny		wszelkie typy lasów i zadrzewień, półotwarte obszary polno-łąkowe oraz otoczenia zbiorników wodnych		ŚCISŁA
61.	Płomykówka	<i>Tyto alba</i>	prawdopodobnie lęgowy	brak danych				ŚCISŁA (*)(**)
62.	Puchacz	<i>Bubo bubo</i>	prawdopodobnie lęgowy	brak danych		dawniej podawane stanowisko w Borach Kujawskich, obecnie nie potwierdzono występowania		ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A215
63.	Puszczyk	<i>Strix aluco</i>	lęgowy	średnio liczny	↔	lasy liściaste i mieszane, spotykany w całym Nadleśnictwie – rzadziej w kompleksie Puszczy nad Gwdą – Leśnictwo Plecemin		ŚCISŁA (**)
64.	Sowa uszata	<i>Asio otus</i>	lęgowy	nieliczny		krajobraz rolniczo-leśny, skraje lasów		ŚCISŁA
65.	Włochatka	<i>Aegolius funereus</i>	prawdopodobnie lęgowy	brak danych		Puszcza nad Gwdą – lokalizacja podana na podstawie Projektu Planu Ochrony OSO		ŚCISŁA

66.	Lelek	<i>Caprimulgus europaeus</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny przy dolnej granicy oceny		rozczłonkowane zrębami zupełnymi bory sosnowe: Leśnictwo Plecemin, Augustowo, Rudna	ŚCISŁA BD I kod gatunku A224
67.	Jerzyk	<i>Apus apus</i>	prawdopodobnie lęgowy	brak danych		regularnie polujące nad lasami, w okresie lęgowym obserwowany nad Borami Kujańskimi nie można wykluczyć lęgów w dziuplach	ŚCISŁA
68.	Zimorodek	<i>Alcedo atthis</i>	lęgowy	nieliczny	↔	obrzeża wód stojących i płynących z urwistymi brzegami; głównie dolina Głomii, Gwdy, Łobzonki, Kocuni, obrzeża jeziora Borówno	ŚCISŁA (*)(**) BD I kod gatunku A229
69.	Dudek	<i>Upupa epops</i>	lęgowy	nieliczny	↑	luźno zadrzewione tereny łąkowe, obrzeża lasów; dotychczas stwierdzony w Leśnictwach Wierzchołek i Kujan	ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A232
70.	Krętogłów	<i>Jynx torquilla</i>	lęgowy	średnio liczny		obrzeża lasów i zadrzewień różnego typu	ŚCISŁA
71.	Dzięcioł zielonosiwy	<i>Picus canus</i>	prawdopodobnie lęgowy			samiec w okresie lęgowym stwierdzony koło Łobżenicy na południe od Leśnictwa Łobzonka	ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A234
72.	Dzięcioł zielony	<i>Picus viridis</i>	lęgowy	średnio liczny	↔ lub ↑	obrzeża lasów i zadrzewienia różnego typu	ŚCISŁA (*)
73.	Dzięcioł czarny	<i>Dryocopus martius</i>	lęgowy	średnio liczny lub liczny przy dolnej granicy oceny	↔	stare drzewostany, przede wszystkim bory sosnowe	ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A236
74.	Dzięcioł duży	<i>Dendrocopos major</i>	lęgowy	liczny		występuje we wszelkich typach lasów i zadrzewieniach	ŚCISŁA
75.	Dzięcioł średni	<i>Dendrocopos medius</i>	lęgowy	średnio liczny przy dolnej granicy oceny	↔	związany ze starymi drzewostanami dębowymi spotykany głównie w Leśnictwach Leśnik, Łobzonka oraz m.in. w Parku Zwierzyniec	ŚCISŁA (*) BD I kod gatunku A238
76.	Dzięciołek	<i>Dendrocopos minor</i>	lęgowy	średnio liczny		stare i średniowiekowe lasy liściaste, częściej olsy i brzeziniaki	ŚCISŁA
77.	Lerka	<i>Lullula arborea</i>	lęgowy	liczny	↔ lub ↑	zręby zupełne i obrzeża borów; liczniej w Leśnictwach Plecemin, Augustowo, Paruszka oraz w Borach Kujańskich	ŚCISŁA BD I kod gatunku A246
78.	Skowronek	<i>Alauda arvensis</i>	lęgowy	liczny przy dolnej granicy oceny		krajobraz rolniczy: pola uprawne, ugory, pastwiska	ŚCISŁA
79.	Dymówka	<i>Hirundo rustica</i>	lęgowy	nieliczny		przy osadach leśnych	ŚCISŁA
80.	Oknówka	<i>Delichon urbica</i>	lęgowy	nieliczny		przy osadach leśnych	ŚCISŁA
81.	Świergotek drzewny	<i>Anthus trivialis</i>	lęgowy	liczny		obrzeża lasów, powierzchnie po rębni gniazdowej	ŚCISŁA

82.	Świergotek łąkowy	<i>Anthus pratensis</i>	łągowy	średnio liczny		łąki, pastwiska		ŚCISŁA
83.	Pliszka żółta	<i>Motacilla flava</i>	łągowy	nieliczny lub średnio liczny przy dolnej granicy oceny		łąki, pastwiska, pola uprawne roślin okopowych		ŚCISŁA
84.	Pliszka górska	<i>Motacilla cinerea</i>	prawdopodobnie łągowy			gniazdowanie prawdopodobne w dolinie Głomii i Łobzonki		ŚCISŁA
85.	Pliszka siwa	<i>Motacilla alba</i>	łągowy	średnio liczny przy dolnej granicy oceny		głównie przy osadach ludzkich i wzdłuż brzegów wód		ŚCISŁA
86.	Strzyżyk	<i>Troglodytes troglodytes</i>	łągowy	liczny		zamieszkuje wszelkie typy lasów z bujniejszym podszytem liczniej w lasach wilgotnych i olsach		ŚCISŁA
87.	Pokrzywnica	<i>Prunella modularis</i>	łągowy	średnio liczny lub liczny przy dolnej granicy oceny		drzewostany z udziałem świerka w podszybie, uprawy i młodniki świerkowe		ŚCISŁA
88.	Rudzik	<i>Erithacus rubecula</i>	łągowy	bardzo liczny		wszelkie typy lasów		ŚCISŁA
89.	Słowik szary	<i>Luscinia luscinia</i>	łągowy	nieliczny lub średnio liczny przy dolnej granicy oceny		związany głównie z terenami podmokłymi; najliczniej występuje na obrzeżach wilgotnych lasów i zagajników olchowych, jak również w niewielkich zadrzewieniach lub zakrzewieniach wokół zbiorników wodnych		ŚCISŁA BD I kod gatunku A270
90.	Słowik rdzawy	<i>Luscinia megarhynchos</i>	prawdopodobnie łągowy			dotychczas stwierdzany sporadycznie na gruntach poza Nadleśnictwem Złotów		ŚCISŁA
91.	Kopciuszek	<i>Phoenicurus ochruros</i>	łągowy	nieliczny	↔	występuje koło osad leśnych		ŚCISŁA
92.	Pleszka	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	łągowy	średnio liczny lub liczny		głównie występuje w starszych drzewostanów sosnowych: Leśnictwa Plecemin, Augustowo oraz Bory Kujańskie; chętnie zasiedla budki łągowe		ŚCISŁA
93.	Pokląska	<i>Saxicola rubetra</i>	łągowy	średnio liczny		wilgotne ugory, bagna, tereny rolnicze z rozproszonymi krzewami		ŚCISŁA
94.	Kląskawka	<i>Saxicola torquata</i>	prawdopodobnie łągowy			dotychczas stwierdzony koło wsi Śmiardowo Złotowskie, gniazdowania na terenie Nadleśnictwa nie można wykluczyć		ŚCISŁA
95.	Białorzotka	<i>Oenanthe oenanthe</i>	prawdopodobnie łągowy			dotychczas stwierdzany sporadycznie na gruntach poza Nadleśnictwem Złotów		ŚCISŁA
96.	Kos	<i>Turdus merula</i>	łągowy	liczny		wszystkie typy lasów		ŚCISŁA

97.	Kwiczol	<i>Turdus pilaris</i>	lęgowy	średnio liczny lub liczny przy dolnej granicy oceny		głównie krajobraz rolniczy, najczęściej niewielkie pasy zadrzewień w pobliżu łąk i pastwisk		ŚCISŁA
98.	Śpiewak	<i>Turdus philomelos</i>	lęgowy	liczny		wszelkie typy lasów		ŚCISŁA
99.	Drożdżik	<i>Turdus iliacus</i>	przelotny					ŚCISŁA
100.	Paszkot	<i>Turdus viscivorus</i>	lęgowy	średnio liczny	↑	rozległe, wysokopiennie bory i bory mieszane; częściej w Borach Kujańskich i w Puszczy nad Gwdą		ŚCISŁA
101.	Świerszczak	<i>Locustella naevia</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny		łąki z kępami krzewów, obrzeża zbiorników wodnych w sąsiedztwie łąk, młodniki i zręby z bujną roślinnością zielną		ŚCISŁA BD I kod gatunku A290
102.	Strumieniówka	<i>Locustella fluviatilis</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny		wilgotne lasy w pobliżu łąk, miejsca z niewielkimi strumykami i rowami		ŚCISŁA BD I kod gatunku A291
103.	Brzęczka	<i>Locustella luscinioides</i>	lęgowy	nieliczny		rozległe szuwary nad jeziorami, stawami oraz innymi zbiornikami; liczniej na Stawach Szwarcza		ŚCISŁA BD I kod gatunku A292
104.	Rokitniczka	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny		siedliska związane z wodą lub podmokłe	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA BD I kod gatunku A295
105.	Łozówka	<i>Acrocephalus palustris</i>	lęgowy	liczny		miejsca związane z wysoką roślinnością zielną: nieużytki, niskie zarośla, pola uprawne		ŚCISŁA
106.	Trzcinniczek	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	lęgowy	średnio liczny		pasie szuwarów z dominacją trzciny wzdłuż zbiorników wodnych lub miejscach nie zalanych		ŚCISŁA BD I kod gatunku A297
107.	Trzciniak	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	lęgowy	nieliczny	↔	trzciniowiska wzdłuż zbiorników wodnych: Stawy Szwarcza, jezioro Wielki Smólsk		ŚCISŁA
108.	Zaganiacz	<i>Hippolais icterina</i>	lęgowy	średnio liczny		najczęściej spotykany w strefach ekotonowych las- powierzchnia otwarta, unika wnętrza dużych kompleksów leśnych		ŚCISŁA
109.	Piegża	<i>Sylvia curruca</i>	lęgowy	średnio liczny lub liczny przy dolnej granicy oceny		skupienia zwartych krzewów w krajobrazie rolniczym, skraje wszelkiego typu lasów, młodniki liściaste i mieszane		ŚCISŁA
110.	Cierniówka	<i>Sylvia communis</i>	lęgowy	średnio liczny lub liczny przy dolnej granicy oceny		luźne zadrzewienia sąsiadujące z terenami otwartymi		ŚCISŁA
111.	Gajówka	<i>Sylvia borin</i>	lęgowy	liczny		lasie liściaste głównie grądy i olsy		ŚCISŁA
112.	Kapturka	<i>Sylvia atricapilla</i>	lęgowy	bardzo liczny		lasie wszelkiego typu z bujnie rozwiniętym podszyciem		ŚCISŁA

113.	Świstunka	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	lęgowy	liczny		starsze drzewostany liściaste i mieszane		ŚCISŁA
114.	Pierwiosnek	<i>Phylloscopus collybita</i>	lęgowy	bardzo liczny		wszelkie typy lasów		ŚCISŁA
115.	Piecuszek	<i>Phylloscopus trochilus</i>	lęgowy	bardzo liczny		szczególnie młodniki i drągowiny sosnowe, w starszych drzewostanach głównie skraje lasów		ŚCISŁA
116.	Mysikrólik	<i>Regulus regulus</i>	lęgowy	liczny		drzewostany iglaste, w mniejszym stopniu związany ze świerkiem od zniczka		ŚCISŁA
117.	Zniczek	<i>Regulus ignicapillus</i>	lęgowy	średnio liczny	↑	w drzewostanach z domieszką minimum grupową świerka średnich i starszych klas wieku		ŚCISŁA
118.	Mucholówka szara	<i>Muscicapa striata</i>	lęgowy	średnio liczny lub liczny przy dolnej granicy oceny		świetliste drzewostany liściaste i mieszane rzadziej iglaste, często brzegi kompleksów leśnych		ŚCISŁA
119.	Mucholówka mała	<i>Ficedula parva</i>	lęgowy	średnio liczny; słabo poznane występowanie na terenie Nadleśnictwa		związana głównie z drzewostanami bukowymi, również stare drzewostany iglaste z podsadzeniami bukowymi; spotykana m.in. w parku Zwierzyniec, Leśnictwach: Leśnik, Łobzonka i Witrogoszcz		ŚCISŁA BD I kod gatunku A320
120.	Mucholówka żałobna	<i>Ficedula hypoleuca</i>	lęgowy	liczny		głównie w drzewostanach liściastych i mieszanych		ŚCISŁA
121.	Wąsatka	<i>Panurus biarmicus</i>	lęgowy	nieliczny		jedynym miejscem występowania na terenie Nadleśnictwa są Stawy Szwarca oraz trzcinowiska Łąk Kocuńskich		ŚCISŁA BD I kod gatunku A323
122.	Raniuszek	<i>Aegithalos caudatus</i>	lęgowy	średnio liczny		lasy z gęstym podszytem		ŚCISŁA
123.	Sikora uboga	<i>Parus palustris</i>	lęgowy	średnio liczny		lasy lęgowe, olchowe i grądy a także drzewostany mieszane		ŚCISŁA
124.	Czarnogłówka	<i>Parus montanus</i>	lęgowy	średnio liczny		zadrzewienia na terenach podmokłych		ŚCISŁA
125.	Czubatka	<i>Parus cristatus</i>	lęgowy	liczny		bory sosnowe		ŚCISŁA
126.	Sosnowka	<i>Parus ater</i>	lęgowy	liczny lub bardzo liczny		bory sosnowe		ŚCISŁA
127.	Modraszka	<i>Parus caeruleus</i>	lęgowy	liczny lub bardzo liczny		lasy liściaste i mieszane rzadziej bory sosnowe, zadrzewienia		ŚCISŁA
128.	Bogatka	<i>Parus major</i>	lęgowy	bardzo liczny		lasy wszelkich typów		ŚCISŁA
129.	Kowalik	<i>Sitta europaea</i>	lęgowy	liczny		drzewostany liściaste zwłaszcza dębowe, również lasy mieszane i bory z domieszką dęba		ŚCISŁA
130.	Pelzacz leśny	<i>Certhia familiaris</i>	lęgowy	liczny		lasy wszelkich typów		ŚCISŁA

131.	Pełzacz ogrodowy	<i>Certhia brachydactyla</i>	lęgowy	liczny		lasy wszelkich typów		ŚCISŁA
132.	Remiz	<i>Remiz pendulinus</i>	lęgowy	nieliczny	↓	zadrzewienia wierzbowe, topolowe i olchowe porastające brzegi rzek i zbiorników wodnych	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA BD I kod gatunku A336
133.	Wilga	<i>Oriolus oriolus</i>	lęgowy	liczny		lasy głównie liściaste i mieszane, nie unika też borów sosnowych z domieszką gatunków liściastych		ŚCISŁA
134.	Gąsiorek	<i>Lanius collurio</i>	lęgowy	średnio liczny lub liczny przy dolnej granicy oceny		luźne zadrzewienia w otwartym krajobrazie, skraje lasów graniczące z otwartymi powierzchniami, uprawy i młodniki		ŚCISŁA BD I kod gatunku A338
135.	Srokosz	<i>Lanius excubitor</i>	prawdopodobnie lęgowy			dotychczas stwierdzany sporadycznie na gruntach poza Nadleśnictwem Złotów, gniazdowania na terenie Nadleśnictwa nie można wykluczyć		ŚCISŁA BD I kod gatunku A340
136.	Sójka	<i>Garrulus glandarius</i>	lęgowy	liczny		wszelkie typy lasów		ŚCISŁA
137.	Sroka	<i>Pica pica</i>	lęgowy	nieliczny		luźne zadrzewienia i zakrzewienia w krajobrazie rolniczym, również przy osadach leśnych		CZEŚCIOWA
138.	Wrona	<i>Corvus corone</i>	lęgowy	nieliczny	↔ lub ↑	zadrzewienia śródpolne i obrzeża lasów, często lasy wokół zbiorników wodnych, na terenie Nadleśnictwa spotykana regularnie w okresie lęgowym w lasach wokół jeziora Borówno		CZEŚCIOWA
139.	Kruk	<i>Corvus corax</i>	lęgowy	średnio liczny	↔ lub ↑	głównie w borach sosnowych w wieku powyżej 80 lat		CZEŚCIOWA
140.	Szpak	<i>Sturnus vulgaris</i>	lęgowy	bardzo liczny		unika wnętrza dużych kompleksów leśnych, chyba że są poprzecinane terenami otwartymi, głównie skraje lasów		ŚCISŁA
141.	Wróbel	<i>Passer domesticus</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny		związany z leśniczówkami zlokalizowanymi na wsi lub w krajobrazie rolniczym		ŚCISŁA
142.	Mazurek	<i>Passer montanus</i>	lęgowy	średnio liczny		w mniejszym stopniu związany z osadami ludzkimi niż wróbel, zadrzewienia śródpolne oraz na obrzeżach lasów w pobliżu pól		ŚCISŁA
143.	Zięba	<i>Fringilla coelebs</i>	lęgowy	bardzo liczny		wszelkie typy lasów, zadrzewienia		ŚCISŁA
144.	Jer	<i>Fringilla coelebs</i>	przelotny					ŚCISŁA

145.	Kulczyk	<i>Serinus serinus</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny		występuje koło osad leśnych, niewielkie zadrzewienia śródpolne oraz skraje lasów w sąsiedztwie terenów otwartych		ŚCISŁA
146.	Dzwoniec	<i>Carduelis chloris</i>	lęgowy	średnio liczny lub liczny		w krajobrazie rolniczym w przydrożnych alejach drzew, zadrzewieniach, skraje lasów		ŚCISŁA
147.	Szczygieł	<i>Carduelis carduelis</i>	lęgowy	średnio liczny	↓	tereny otwarte lub luźne zadrzewienia, skraje lasów		ŚCISŁA
148.	Czyż	<i>Carduelis spinus</i>	prawdopodobnie lęgowy			obserwowany w okresie lęgowym w Leśnictwie Łączyń i Borach Kująskich w drzewostanach z domieszką świerka		ŚCISŁA
149.	Makolągwa	<i>Carduelis cannabina</i>	lęgowy	średnio liczny				ŚCISŁA
150.	Czczotka	<i>Carduelis flammea</i>	przelotny, zimujący					ŚCISŁA BD I kod gatunku A368
151.	Krzyżodziób świerkowy	<i>Loxia curvirostra</i>	przelotny, zimujący					ŚCISŁA
152.	Dziwonia	<i>Carpodacus erythrinus</i>	prawdopodobnie lęgowy			dotychczas stwierdzany na gruntach poza Nadleśnictwem Złotów m.in. w dolinie Głomii, gniazdowania na terenie Nadleśnictwa nie można wykluczyć		ŚCISŁA BD I kod gatunku A371
153.	Gil	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	lęgowy	średnio liczny		bory sosnowe, lasy liściaste z domieszką świerka	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA
154.	Grubodziób	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	lęgowy	liczny		las liściaste i mieszane szczególnie z domieszką graba		ŚCISŁA
155.	Trznadel	<i>Emberiza citrinella</i>	lęgowy	liczny lub bardzo liczny		obrzeża lasów, śródleśne polany, uprawy i młodniki leśne		ŚCISŁA
156.	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	lęgowy	nieliczny lub średnio liczny		występuje lokalnie, dotychczas stwierdzony na terenie Leśnictwa Leśnik oraz w okolicach szkółki leśnej Mały Borek	występowanie na terenie Nadleśnictwa słabo poznane	ŚCISŁA BD I kod gatunku A379
157.	Potrzos	<i>Emberiza schoeniclus</i>	lęgowy	średnio liczny		tereny bagienne i podmokłe z krzewami i szuwarami, trzciny, łąki o zróżnicowanym stopniu uwilgotnienia		ŚCISŁA
158.	Potrzeszcz	<i>Emberiza calandra</i>	lęgowy	nieliczny		występuje w otwartym krajobrazie rolniczym unikając sąsiedztwa lasów i większych skupień drzew		ŚCISŁA

¹⁾ Status ochrony w Polsce (Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419))

ŚCISŁA – gatunki objęte w Polsce ochroną ścisłą

CZĘŚCIOWA – gatunki objęte w Polsce ochroną częściową

(*) – gatunki wymagające ochrony czynnej

(**) – gatunki, których dotyczy zakaz fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie

BD I – gatunek z załącznika I Dyrektywy Ptasiej